

开放性伤口的止血包扎

要求：

请在模型上完成大腿股前中下段皮肤撕裂伤创面清创前止血包扎（指压止血、填塞止血，加压包扎止血，止血带止血），对小腿膝关节广泛皮肤挫裂伤清创后进行包扎（螺旋形包扎法，8字形包扎法）操作，清理器械物品。

项 目	具体内容	标准分	实得分
操作前准备	1.1 评估与医患沟通；物品准备等 【评分点】 评估患者：神志意识（1'），呼吸（1'）、脉搏（1'）、血压（1'口述），循环评估（1'），出血量 200ml（1'），出血部位（1'），呼叫同伴参与急救（1'） 安抚伤员，解释止血、包扎的目的，取得伤员同意配合（1'）[需口述] 协助伤员保持平卧体位，勿自主活动（1'） 快速检查所需器械、物品（1'）	11	
操作过程	2.1 无菌观念；戴口罩、帽子 【评分点】 清创前操作者正确戴好口罩（2'）、帽子（2'） 2.2 止血 【评分点】 操作者迅速戴好无菌手套（4'） 用指压法压迫患侧股动脉部位准确（4'），用无菌纱布填塞法压迫深在出血伤口（4'）；用加压包扎止血法包扎绷带松紧适中（4'），绷带打结于肢体前外侧（4'）；用绞紧止血带止血法：止血带部位选择正确（4'），由肢体远端向近端适当驱血（4'），运用止血带衬垫（4'），上止血带压力适当（4'口述），止血带标记（4'），止血带记时（4'） 2.3 包扎 【评分点】 选择合适宽窄绷带（4'），自脚踝起到膝关节远端（4'）；螺旋形包扎每一周压盖前一周的 1/3~1/2（4'），至膝关节处“8”字包绕包扎（4'），包扎平整无褶皱（4'），包扎绷带松紧适中（4'），骨突和肢体内侧应加软垫防止压迫摩擦皮肤坏死（4'），打结应在肢体前外侧非坐压部位（4'），包扎完毕检查肢体血运，询问伤员有无不适（4'口述）	4	
总体评价	3.1 操作熟练 【评分点】 操作熟练（1'）、过程有条理、不慌乱（1'） 3.2 爱伤观念，仪表、态度 【评分点】 动作力度得当，操作时态度认真严谨，全局观念强（1'） 3.3 物品整理复原及时间控制 【评分点】 解开全部绷带，将绷带和棉垫放回原处，将纱布和棉球等材料丢弃到正确位置（1'），操作时间控制在 10 分钟内（1'）	1	