

# 清创

姓名

学号

实得分 分

| 项 目   | 具体内容  | 标准分 | 实得分 |
|---|---|-----|-----|
| 操作前准备   | 1.1 评估与医患沟通；物品准备等<br><br>【评分点】<br>评估患者：神志意识（1'），呼吸（1'）、脉搏（1'）、血压（1'口述），循环评估（1'），出血量（1'），出血部位（1'），评估合并损伤如内脏、神经、血管，骨骼、肌腱等（1'口述）<br>安抚伤员，解释清创的目的，取得伤员同意配合（1'）〔需口述〕<br>协助伤员保持平卧体位，勿自主活动（1'）<br>快速检查所需器械、物品（1'）  | 11  |     |
|   | 2.1 无菌观念；戴口罩、帽子<br><br>【评分点】<br>清创前操作者正确戴好口罩（2'）、帽子（2'）   | 4   |     |
|   | 2.2 清创术<br><br>【评分点】<br>操作者用洗手液洗手（2'），戴好无菌手套（2'） 用无菌纱布覆盖伤口（2'），先清除肉眼可见伤口周玻璃碎渣（2'），用肥皂液和无菌毛刷刷洗伤口周围的皮肤（2'），冲洗时肥皂水不流入伤口内（2'）<br>用无菌生理盐水冲洗伤口周围皮肤 3 次（4'）〔须满 3 次〕，每次冲洗后更换手套和毛刷、更换覆盖伤口的无菌纱布（2'）〔可口述〕<br>去除覆盖于伤口的无菌纱布，用无菌生理盐水冲洗伤口（2'），纱布轻轻擦拭伤口内组织（2'）<br>3%过氧化氢溶液（双氧水）冲洗伤口（2'），之后用无菌生理盐水冲洗干净（2'），再用无菌棉球擦干伤口内的冲洗液和伤口周围皮肤（2'）<br>检查伤口情况，覆盖上无菌纱布（2'）<br>消毒清创周皮肤范围足够（2'） 消毒液未进入伤口（2'） 消毒完毕后，更换手套（2'），铺巾正确（2'），选择适当麻醉（2'口述），按一定顺序清理伤口（4'口述），再次冲洗伤口，生理盐水冲洗伤口 2~3 遍（2'），去除旧无菌巾，更换手套（2'），重新铺盖无菌巾（2'），并更换已用过的手术器械（2'），组织缝合修复（2'口述），决定是否放置引流物（2'口述），伤口无菌敷料覆盖，石膏托固定（2'口述），骨突和肢体内侧应加软垫防止压迫摩擦皮肤坏死（2'），螺旋形包扎每一周压盖前一周的 1/3~1/2（2'），从足底至膝关节处“8”字包绕包扎（2'），足部膝关节呈功能位固定（2'），包扎平整无褶皱，松紧适中（2'），打结应在肢体前外侧非坐压部位（2'），包扎完毕检查肢体血运，询问伤员有无不适（2'口述） | 72  |     |
|   | 3.1 操作熟练<br><br>【评分点】<br>操作熟练、清洁顺序正确（2'），过程有条理、不慌乱（2'）  | 4   |     |
|   | 3.2 爱伤观念，仪表、态度<br><br>【评分点】<br>动作力度得当（2'），操作时态度认真严谨，与伤员沟通时有礼貌（2'）   | 4   |     |
| 3.3 物品整理复原<br><br>【评分点】<br>解开全部绷带（1'）将绷带和石膏托放回原处，清理现场的水渍，将纱布和棉球等材料丢弃到正确位置（1'），操作总时间控制在 5 分钟内（2'） 废液废料均应置于弯盘内（1'） 〔违 | 5   |     |     |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 反无菌原则，扣 13'】 |
|--|--------------|