

# 胸腔穿刺术

姓名	学号	实得分	分
项 目	具体内容	标准分	实得分
操作前准备	1.1 物品准备，与患者的沟通	8	
	<b>【评分点】</b> 准备和检查物品是否齐全完好（2'）[物品检查过程中漏项或检查方法不正确均不给分] 核对患者的姓名、床号（1'）[漏项不给分] 解释胸穿的目的（2'），安抚、取得病人同意配合（1'）告知病人胸穿过程的注意事项（2'）		
操作过程	2.1 无菌观念，戴口罩、帽子，患者体位的选择	8	
	<b>【评分点】</b> 操作者正确戴好口罩（1'）、帽子（1'） 操作者手清洁和消毒，消毒洗手液洗手（2'） 协助患者采取舒适体位，坐位、面向椅背（2'）、两前臂置于椅背、前额伏于前臂（2'）		
	2.2 穿刺点部位选择和皮肤消毒	34	
	<b>【评分点】</b> 两侧胸部视、触、叩、听（8'），（模拟人以叩诊为主，双侧对称进行，遗漏一侧扣4'）选择叩诊实音最明显处进行（2'）一般选择肩胛下角线第7~8肋间（4'），穿刺点用蘸龙胆紫的棉签在皮肤做标记（2'） 打开胸穿包第一层，取出无菌镊子（2'），用无菌镊子打开胸穿包第二层（2'），用镊子取出小药碗（2'），一手拿弯盘，另一手用镊子取出安尔碘棉球若干放入小药碗（2'），常规消毒皮肤（消毒范围半径10~15cm、消毒顺序从中心向外侧、消毒次数3次或3次以上、消毒熟练程度各2'）（8'）。 以上操作顺序正确（2'）[操作顺序有错误不给分]		
	2.3 胸腔穿刺术	40	
	<b>【评分点】</b> 戴无菌手套（2'）（其中注意无菌1'，熟练程度1'），覆盖消毒洞巾（2'），在助手帮助下用5ml针筒抽取约5ml利多卡因液（2'），排出针筒内气体（2'），取下一肋骨的上缘为穿刺点（2'），自皮肤至胸膜壁层局部浸润麻醉（6'）（进针角度30~45度、皮丘、先回抽再推麻药垂直逐层麻醉各2'），胸膜突破感后回抽液体（2'），退出局麻注射器，左手拿无菌纱布按压片刻（2'），检查胸腔穿刺针是否漏气（2'），用血管钳将穿刺针后的橡皮管夹闭（2'），用穿刺针和局麻用5ml注射器比较以明确进针深度，右手持针大约在该位置（2'），左手食指和中指固定穿刺部位的皮肤（1'），右手持针由麻醉处缓慢垂直进针（1'），胸膜突破感后橡皮管接80ml注射器（1'），助手帮忙松开血管钳，并用血管钳固定好穿刺针（1'），回抽液体，注射器液体抽满后再次用血管钳夹闭橡皮管（2'）取下注射器，液体计量（1'）并分别注入3个试管（1'）。抽液结束，拔出穿刺针，覆盖无菌纱布（1'），按压片刻，用胶布固定（1'）。嘱患者静卧。（2'） 操作顺序正确（2'）[操作顺序有错误不给分]		
总体	3.1 操作熟练、无菌观念	5	

评价	<b>【评分点】</b> 操作熟练，稳重，操作顺序有条理、不慌乱（2'），有无菌意识（2'）[操作过程中违反无菌原则不给分] 防止空气进入胸腔，保持胸腔负压（1'）		
	3.2 爱伤观念、仪表、态度	2	
	<b>【评分点】</b> 操作时动作小心，爱伤意识，操作中时刻注意患者的反应（1'） 操作时态度认真严谨，沟通时有礼貌（1'）		
	3.3 物品复原整理	3	
	<b>【评分点】</b> 时间把握得当，规定时间内完成（1'） 物品基本复原（1'）、废物废料销毁、丢弃到正确的位置（1'）[操作环境未清理干净或丢弃不当，均不给分]		