

股静脉置管

| 项 目 | 具体内容 | 实得分 | 分 |
|-------|--|-----|---|
| 操作前准备 | <p>1.1 物品准备，与患者或家属的沟通</p> <p>【评分点】 核对患者的姓名、性别、床号（1'）[漏项不给分] 与病人或家属谈话，做好解释工作，取得病人同意，争取清醒病人配合（2'）[无口述不给分] 准备和检查物品是否齐全完好，中心静脉穿刺包、消毒药水、局麻药、无菌手套、肝素帽等（1'）[漏项或检查方法不正确均不给分] 操作前场地准备（要求在灭菌消毒房间内进行）（1'）[无口述不给分]</p> | 5 | |
| 操作过程 | <p>2.1 戴口罩、帽子、洗手</p> <p>【评分点】 操作者正确戴好口罩（3'）、帽子（3'）[已全部戴好并且规范，建议给 6'] 消毒洗手液洗手（3'）</p> <p>2.2 患者体位的选择</p> <p>【评分点】 病人取平卧位，膝关节微屈，臀部稍垫高，髋关节伸直并稍外展外旋（4'）[需辅以口述，无口述不给分]</p> <p>2.3 穿刺点选择</p> <p>【评分点】 一般首选右侧股静脉（4'）（无口述可以考虑给分） 以股动脉内侧 0.5cm 与腹股沟韧带下方 2cm 交点为穿刺点（8'）</p> <p>2.4 消毒、局麻、穿刺</p> <p>穿刺点皮肤消毒 3 遍（4'），消毒范围 15cm （4'） 操作者立于病人穿刺侧，戴无菌手套（4'），打开穿刺包，检查器械（4'），铺洞巾（4'）[助手可协助固定洞巾] 穿刺点处皮内、皮下浸润麻醉（4'） 用左手示指、中指摸清股动脉搏动，右手持试穿针，针干与皮肤呈 45~60 度角，（4'）从动脉搏动内侧约 0.5~1.0cm 刺入回抽有暗红血液流出。一经成功，认准方向、角度和进针深度后拔出试穿针。（8'）[不成功不给分，反复一次扣 4'至本项为 0 分为止] 按试穿针的角度、方向及深度改用 18G 穿刺针进行穿刺，回抽有暗红血液流出（8'）[不成功不给分，反复一次扣 4'至本项为 0 分为止] 固定好穿刺针，依次置入导丝，扩张器，中心静脉导管（8'）[不成功不给分，反复一次扣 4'至本项为 0 分为止] 留置深度约 12~15cm（4'），穿刺成功后应将导管内的气体抽出，连接输液器或肝素帽，妥善固定（4'） [操作中违反无菌原则，扣 8']</p> | 9 | |
| 总体评价 | <p>3.1 操作熟练</p> <p>【评分点】 操作稳重、熟练（2'），顺序有条理、不慌乱（2'）（操作中形成血肿或误穿动脉均扣 1'）</p> <p>3.2 爱伤观念、文明用语、仪表、态度</p> | 4 | |

| | | |
|----------|--|--|
| | <p>【评分点】 操作用力得当不粗暴 (1')，操作中时刻注意患者的反应 (1') 操作时态度认真严谨，沟通时有礼貌 (1')</p> | |
| 3.手术器具整理 | 3 | |

【评分点】
规定时间内完成 (1')，收拾妥当操作用器具，勿遗留在诊疗床上，将医疗废弃物放入指定地点 (2') [操作环境未清理干净或丢弃不当，均不给分]